



Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss LAMISIL DERMGEL jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 2 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet

1. Was ist **LAMISIL DermGel** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von **LAMISIL DermGel** beachten?
3. Wie ist **LAMISIL DermGel** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **LAMISIL DermGel** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST LAMISIL DERMGEL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

LAMISIL DermGel ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Pilzinfektionen der Haut (Antimykotikum). Es wirkt, indem es den Pilz abtötet, der zu Hautproblemen führt.

Anwendungsgebiet

- Pilzinfektion der Füße (Tinea pedis interdigitalis)
- Pilzinfektion im Leistenbereich (Tinea cruris)
- Pilzinfektion des Körpers (Ringflechte = Tinea corporis)
- Kleinpilzflechte der Haut (Pityriasis versicolor).

Wenn Sie die Ursache Ihrer Infektion nicht sicher kennen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie **LAMISIL DermGel** anwenden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LAMISIL DERMGEL BEACHTEN?

LAMISIL DermGel darf nicht angewendet werden

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels sind (siehe Liste der Inhaltsstoffe unter Punkt 6).

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn dies bei Ihnen der Fall ist und wenden Sie **LAMISIL DermGel** nicht an.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von LAMISIL DermGel ist erforderlich

- Kinder unter 18 Jahren sollten **LAMISIL DermGel** nicht anwenden.
- Verwenden Sie das **DermGel** nicht im Gesicht oder auf der verletzten oder geschwollenen Haut, da Alkohol dort irritierend wirken kann.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.

Bei Anwendung von LAMISIL DermGel mit anderen Arzneimitteln

Wenden Sie während der Behandlung mit **LAMISIL DermGel** keine anderen Arzneimittel oder Behandlungen im betroffenen Bereich an, auch wenn es sich nicht um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anzuwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder glauben, Sie könnten schwanger sein, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. **LAMISIL DermGel** sollte während der Schwangerschaft nur nach ärztlicher Rücksprache angewendet werden.

Stillende Mütter sollten **LAMISIL DermGel** nicht anwenden. Säuglinge dürfen nicht in Kontakt mit behandelter Haut einschließlich der Brust kommen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

LAMISIL DermGel hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von LAMISIL DermGel

Butylhydroxytoluol (E 321) kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

3. WIE IST LAMISIL DERMGEL ANZUWENDEN?

Wenden Sie **LAMISIL DermGel** immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dauer und Häufigkeit der Behandlung

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wenden Sie das Gel eine Woche lang einmal täglich an den betroffenen Hautstellen an.

Art der Anwendung

Folgen Sie sorgfältig diesen Anweisungen:

- Reinigen und trocknen Sie die betroffenen Hautpartien und die umliegenden Stellen und waschen Sie Ihre Hände.
- Schrauben Sie die Schraubkappe der Tube ab. Vor der ersten Anwendung ist die Membranversiegelung der Tube mit dem in der Schraubkappe enthaltenen Dorn durchzustechen.
- Drücken Sie die Tube leicht und tragen Sie eine dünne Gelschicht auf die betroffenen Hautpartien und die umliegenden Stellen auf.
- Reiben Sie das Gel sanft in die Haut ein.
- Setzen Sie die Kappe wieder auf die Tube.
- Waschen Sie nach der Anwendung des Gels Ihre Hände, andernfalls kann die Infektion auf andere Stellen der Haut oder andere Menschen übergreifen.

Wenn Sie eine Infektion in den Hautfalten behandeln, können Sie die betroffene Stelle mit einem Gazestreifen abdecken, besonders nachts. Wenn Sie dies tun, verwenden Sie jedes Mal, wenn Sie das Gel auftragen, einen frischen, sauberen Gazestreifen. Ihre Haut sollte sich in wenigen Tagen bessern, es kann aber bis zu 4 Wochen dauern, bis sie vollständig geheilt ist.

Wenn Sie innerhalb von 2 Wochen nach der Anwendung von **LAMISIL DermGel** keine Anzeichen der Besserung bemerken, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Werfen Sie Gelreste 16 Wochen nach dem ersten Öffnen weg.

Mit welchen Maßnahmen kann man die Behandlung unterstützen?

Halten Sie die betroffenen Stellen sauber und waschen Sie sie regelmäßig. Trocknen Sie sie sorgfältig ohne zu reiben oder tupfen Sie sie vorsichtig ab. Auch wenn die Hautpartien jucken, versuchen Sie, nicht zu kratzen, da dies die Symptome verschlimmern und den Heilungsprozess verlangsamen kann oder sich die Infektion weiter ausbreiten kann.

Verwenden Sie Ihre eigenen Handtücher und Kleidungsstücke und tauschen Sie sie nicht mit anderen Menschen aus, da diese Infektionen leicht übertragbar sind. Waschen Sie Ihre Kleidung und Handtücher häufig, um sich selbst vor einer Neuansteckung zu schützen.

Wenn Sie die Anwendung von LAMISIL DermGel vergessen haben

Wenn Sie eine Anwendung des Gels vergessen haben, tragen Sie es so bald wie möglich erneut auf und fahren Sie wie gewohnt mit der Behandlung fort und tragen Sie nur die gewohnte Menge auf. Verwenden Sie das Gel immer gemäß den Angaben. Das ist wichtig, da bei fehlenden Anwendungen das Risiko besteht, dass die Infektion erneut auftritt.

Was ist zu tun, wenn LAMISIL DermGel versehentlich hinuntergeschluckt wird?

Konsultieren Sie umgehend Ihren Arzt. Dieser wird Ihnen sagen, was zu tun ist.

Was ist zu tun, wenn das Produkt versehentlich in Ihre Augen gelangt?

Spülen Sie Ihre Augen sorgfältig unter fließendem Wasser aus. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Produktes haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann LAMISIL DermGel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

In sehr seltenen Fällen treten allergische Reaktionen auf LAMISIL DermGel auf, die zu Schwellungen und Schmerzen, Hautausschlag oder Nesselsucht führen können.

Wenn Sie diese Symptome an sich bemerken, brechen Sie die Behandlung mit dem Gel ab und informieren Sie umgehend Ihren Arzt oder Apotheker.

Rötung, Jucken oder Brennen kann nach der Anwendung bei einigen Patienten auftreten. Dies sind harmlose, milde Nebenwirkungen, die während der Behandlung mit dem Gel auftreten können.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST LAMISIL DERMGEL AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Tube hinter „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 30 °C lagern.

Werfen Sie Gelreste 16 Wochen nach dem ersten Öffnen weg.

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Hausmüll entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie nicht länger benötigte Arzneimittel entsorgt werden können. Diese Maßnahme dient dem Umweltschutz.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was LAMISIL DermGel enthält

Der Wirkstoff ist Terbinafin.

1 g LAMISIL DermGel enthält 10 mg Terbinafin (1 % w/w).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gereinigtes Wasser; Ethanol 96 %; Isopropylmyristat; Polysorbitat 20; Carbomer; Sorbitanlaurat; Benzylalkohol; Natriumhydroxid; Butylhydroxytoluol (E 321).

Wie LAMISIL DermGel aussieht und Inhalt der Packung

LAMISIL DermGel ist ein weißes bis eierschalenfarbendes glänzendes Gel zur Anwendung auf der Haut.

LAMISIL DermGel ist in Packungen zu 5 g, 15 g oder 30 g in Aluminiumtuben mit Schraubkappe erhältlich. Es werden nicht alle Packungsgrößen vermarktet.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Novartis Consumer Health GmbH

81366 München

Zielstattstraße 40, 81379 München

Telefon (089) 78 77-0

Telefax (089) 78 77-444

Email: medical.contactcenter@novartis.com

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2009.

WEITERE DARREICHUNGSFORMEN

LAMISIL Creme	Packungen zu 15 g Creme/N1 und 30 g Creme/N2
LAMISIL Once	Packung zu 4 g Lösung/N1
LAMISIL Spray	Packungen zu 15 ml Lösung/N1 und 30 ml Lösung/N1

PATIENTENINFORMATION

MIT WELCHEN MASSNAHMEN KANN MAN DIE BEHANDLUNG UNTERSTÜTZEN?

- Waschen Sie die erkrankten Hautstellen täglich. Trocknen Sie danach die Füße sorgfältig ab. Einmalhandtücher eignen sich hierfür hervorragend.
- Wechseln Sie täglich Ihre Handtücher, Waschlapen und Strümpfe/Socken. Waschen Sie alle Wäschestücke, die mit dem infizierten Hautbereich in Berührung kommen, bei mindestens 60 °C.
- Kratzen Sie nicht! Dadurch kann sich die befallene Stelle vergrößern oder entzünden, und der Pilz kann auf andere Körperstellen (z. B. die Hände) übertragen werden.

WIE KANN MAN SICH VOR FUSSPILZ SCHÜTZEN?

- Tragen Sie Badeschlappen an Orten, wo viele Menschen barfuß laufen.
- Trocknen Sie Ihre Füße und Zehenzwischenräume nach dem Duschen gut ab.
- Lüften Sie Ihre Schuhe (besonders Ihre feuchten Sportschuhe) regelmäßig, damit sie trocken können.
- Bevorzugen Sie natürliche Materialien. Tragen Sie Baumwollsocken.
- Verwenden Sie hautschonende, pH-neutrale Seifen und Kosmetika, damit auch bei häufigem Waschen der natürliche Schutzmantel der Haut nicht angegriffen wird.
- Tragen Sie gut sitzendes, bequemes Schuhwerk, in dem sich möglichst wenig Wärme staut. Druck- und Schürfstellen von schlecht passenden Schuhen können dem Fußpilz Tür und Tor öffnen.

DE 144189_906312
P111 492 – A55-0

 NOVARTIS